Click Here

¿Sabías que en España existen diferentes tipos de gorriones? Si eres un amante de las aves o simplemente quieres conocer más sobre la fauna de la Península Ibérica, este artículo es para ti. Aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre las características, hábitats y peculiaridades de los gorriones comunes, molineros, chillones, alpines, morunos, de árbol y los gorrión gorrión. Desde las zonas montañosas hasta los bosques y parques urbanos, estos pequeños pájaros están presentes en distintos lugares de España. ¡Acompáñanos en este viaje de descubrimiento! Tipo de GorriónDescripciónHábitatDistribuciónGorrión ComúnPequeño pájaro marrón con rayas negras en la cabeza. Los machos tienen una mancha gris en la nuca y una corona negra.Tierras de cultivo, zonas urbanas y parques.Común en toda España excepto en las regiones más montañosas.Gorrión MolineroMayor que el Gorrión Común, grises y marrones. Los machos tienen un collar negro y una corona gris.Bordes de los bosques, zonas rurales y suburbanas.Extiende por toda España, pero menos común en las regiones áridas del sur.Gorrión ChillónSimilar al Gorrión Común, pero más pequeño con rayas en su pecho y espalda. Los machos tienen una corona negra.Tierras bajas, zonas urbanas y rurales con tierras de cultivo.Común en toda España excepto en las regiones más montañosas.Gorrión MorunoMarrón oscuro y moteado en el pecho. Los machos tienen una mancha blanca en el ala y una pequeña corona negra.Zonas rurales y montañosas.Común en el sur y el Mediterráneo de España.Gorrión AlpinoPequeño pájaro marrón con una corona negra. Tiene una raya blanca en su ala. Los machos tienen una mancha grisácea en la cabeza.Regiones montañosas y alpinas.Común en toda España en zonas rocosas de alta montaña. ¿Sabías que el gorrión común es el ave más común en España? Es posiblemente uno de los pájaros más vistos en todo el territorio español. Esta especie de gorrión se encuentra en prácticamente cualquier ambiente, desde parques urbanos y jardines hasta zonas rurales y campos. Este pequeño pajarito mide alrededor de 14 cm de largo y pesa tan solo 20 gramos. Tiene un pico corto y robusto, y su cabeza está rodeada de una banda grisácea. El gorrión común varía en color según la temporada y el sexo: en invierno, su coloración es más apagada y grisácea, mientras que en verano presenta tonos más vivos y pardo-rojizos. Los machos se diferencian de las hembras en que tienen la cabeza y cuello de color negro. El gorrión común suele alimentarse de semillas, frutas y pequeños insectos, y es muy sociable. Véase también Pájaro herido: ¿Qué hacer?Vive en grupos y suele anidar en pequeñas cavidades, como en agujeros de paredes o techos, o en cajas nido colocadas por los humanos en jardines y parques. A pesar de que el gorrión común es una especie muy abundante en España, ha experimentado un declive en las últimas décadas. Es importante que los humanos tomemos medidas para proteger su hábitat y evitar su desaparición. ¡Sigue leyendo para conocer más sobre los diferentes tipos de gorriones que habitan en España! ¿Conoces el gorrión molinero? Es una especie de gorrión que se encuentra principalmente en el norte y centro de España y se caracteriza por su plumaje marrón grisáceo con tonalidades rojizas en los laterales de la cabeza y el cuello, así como por su pico grueso y corto. El gorrión molinero es un ave pequeña, con una longitud de 14 cm y un peso aproximado de 25 gramos. Suele habitar en zonas abiertas que presentan una mezcla de arbustos y árboles, como campos de cultivo y praderas. A diferencia del gorrión común, el gorrión molinero cuenta con una banda negra en la frente y una mancha blanca en las alas, lo que lo hace fácilmente reconocible. Durante la época de cría, el macho utiliza su canto para atraer a la hembra, y ambos se encargan de construir el nido con ramas, hierbas y musgo. Si quieres avistar al gorrión molinero, te recomendamos visitar los parques nacionales de las Rías Baixas, la sierra del Guadarrama o los Pirineos, donde esta especie puede ser fácilmente observada. ¡No te pierdas la oportunidad de conocer a esta interesante ave! ¿Has oído hablar del Gorrión chillón? Esta especie de gorrión es muy peculiar, ya que suele habitar zonas montañosas de España a una altitud de entre los 1.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Su nombre se debe a su característico canto, que es más agudo y estridente que el de otras especies de gorriones. El Gorrión chillón es fácilmente reconocible debido a su plumaje de tonalidades grises y pardas, así como por tener una mancha roja en la coronilla. A diferencia del Gorrión común, el chillón posee un pico más fuerte y recto, lo que le permite alimentarse de semillas y frutos secos con mayor facilidad. Además, esta especie de gorrión es conocida por ser muy territorial, defendiendo sus áreas de alimentación y nidos con gran ferocidad. Véase también 6 Aves Nativas En Peligro - ¡Descubre su increíble belleza!Aun así, no son aves agresivas entre sí y suelen agruparse en invierno para poder sobrevivir al frío. Si eres aficionado al mundo de las aves o simplemente estás interesado en conocer más sobre la fauna española, no puedes perder la oportunidad de ver al Gorrión chillón en su hábitat natural. Las zonas montañosas de España, como la Sierra de Guadarrama o el Pirineo, son el mejor lugar para poder avistar a esta maravillosa especie. ¡Anímate a explorar y descubrir los variados tipos de gorriones en España! Hablando de gorriones en España, no podemos olvidarnos del gorrión alpino, una especie de gorrión que es comúnmente encontrado en los Pirineos. Como su nombre indica, este tipo de gorrión habita en zonas montañosas y es fácil su avistamiento en las zonas más altas de la cordillera pirenaica. Debido a la geografía única de los Pirineos, el gorrión alpino desempeña un papel importante en el ecosistema de la zona, ya que es parte importante de la cadena alimentaria en ella. Además, su presencia en la región es considerada un indicador del estado de conservación y el bienestar ecológico de la zona. Para los amantes de las aves y los biólogos, avistar al gorrión alpino en los Pirineos es todo un reto y un éxito. Es una gran oportunidad para explorar la belleza de la alta montaña y para conocer más sobre las especies de la zona. Además, esta región también ofrece otras especies de aves raras y endémicas que son únicas y fascinantes. En conclusión, el gorrión alpino es un tesoro natural de los Pirineos, un indicador del equilibrio ecológico y un regalo para aquellos que lo contemplen. Esta especie es solo una de las muchas variedades de gorriones en España, pero vale la pena conocerla y admirarla por su singularidad y belleza. ¿Alguna vez has oído hablar del gorrión moruno? Es una especie de gorrión muy común en la Península Ibérica y el Norte de África. Este pequeño pájaro tiene un plumaje pardo y grisáceo, con la cabeza y la garganta de color marrón oscuro y una mancha blanca en la mejilla. A diferencia de otros gorriones, el gorrión moruno es bastante territorial y suele vivir en grupos pequeños. Prefiere hábitats secos y áridos, como los matorrales y los bosques de encinas y alcornoques. Véase también Misterio revelado: el origen del majestuoso ave quetzalAdemás, es un ave muy vocal, emitiendo una gran variedad de sonidos que muchas veces repite una y otra vez. Aunque su población no está amenazada, el gorrión moruno necesita de la protección de su hábitat para sobrevivir. Por eso es importante conocer más sobre esta especie y valorar su presencia en nuestro entorno natural. Si quieres avistar al gorrión moruno, es mejor hacerlo durante el amanecer o el atardecer, cuando es más activo. Observa su comportamiento y el sonido que emite, ¡quizá te sorprendan sus habilidades para saltar entre las ramas de los árboles! Un simpático y pequeño gorrión reposa tranquilamente sobre una rama, mostrando su plumaje marrón y blanco. ¿Alguna vez has visto un gorrión en un árbol de tu parque local y te has preguntado si es un gorrión común o uno de árbol? Los gorriones de árbol son una especie común en los bosques y parques de España y pueden ser identificados por ciertas características. Estos gorriones tienen un tamaño similar al gorrión común, pero sus colores son más apagados y su pecho tiene un color grisáceo en lugar de marrón claro. Además, su pico es más corto y grueso que el del gorrión común. Los gorriones de árbol prefieren mantenerse en los árboles en lugar de en el suelo, por lo que es más probable que los veas saltando de rama en rama o escuches sus llamadas agudas mientras están en lo alto. También suelen tener un vuelo más suave y ondulante en lugar del vuelo rápido y directo del gorrión común. Observar a los gorriones de árbol puede ser una experiencia fascinante y gratificante. Aunque son menos comunes que el gorrión común, pueden ser identificados fácilmente por sus características distintivas. Un grupo de gorriones posando en un cable telefónico. ¡Sigue explorando los diferentes tipos de gorriones que se pueden encontrar en España! Si has estado observando a los gorriones en España, es posible que hayas notado uno con características únicas en el sur y este de España. Este es el gorrión gorrión, también conocido como el gorrión molinero pardo. Una de las características distintivas del gorrión gorrión es su coloración. Su parte superior es de un marrón grisáceo, con manchas oscuras en la espalda y las alas. La parte inferior es de un gris más claro y tiene una mancha oscura en el pecho. Además de sus colores, el gorrión gorrión también tiene un pico oscuro y un anillo ocular blanco. Estos rasgos lo distinguen de otros tipos de gorriones. En cuanto a los hábitos, a menudo se les encuentra en zonas rurales y cercanas a los cultivos de cereales. También es común que habite en pueblos y ciudades con casas bajas, donde puede anidar en agujeros y cavidades en las paredes. Si deseas avistar gorrión gorrión, se recomienda buscarlos en campos de cultivo y terrenos abiertos en Andalucía, Murcia y Valencia. Es un ave común en esta área de España. ¿Quieres conocer más sobre los otros tipos de gorriones en España? ¡Sigue leyendo nuestro artículo! En conclusión, España alberga una gran variedad de gorriones, cada uno con sus características únicas y fascinantes. El gorrión común, molinero, chillón, alpino, moruno, de árbol y gorrión, todos tienen algo que ofrecer a los amantes de las aves o simplemente a aquellos que aprecian la naturaleza. Aprender sobre estas especies no sólo enriquece nuestro conocimiento, sino que también nos hace conscientes de la importancia de conservar y proteger estas criaturas en nuestro entorno. Si tienes la oportunidad, haz un viaje por los diversos paisajes de España y busca a estos pequeños pero encantadores seres. Y si aún no lo has hecho, ¡conviértete en un defensor de la vida silvestre y ayuda a proteger a estas aves y su hábitat! El Gorrión Común (Passer domesticus) es un ave de la familia de los gorriones Passeridae, que se encuentra en la mayor parte del mundo. Un ave pequeña, tiene una longitud típica de 16 cm. Las hembras y las aves jóvenes son de color marrón pálido y gris, y los machos tienen manchas negras, blancas y marrones más brillantes. Una de las 25 especies del género Passer, el gorrión común es nativo de la mayor parte de Europa, la cuenca mediterránea y gran parte de Asia. Sus introducciones intencionales o accidentales a muchas regiones, incluyendo partes de Australasia, África y las Américas, la convierten en el ave silvestre de mayor distribución. El gorrión común está fuertemente asociado a la habitación humana y puede vivir en entornos urbanos o rurales. Aunque se encuentra en hábitats y climas muy variados, normalmente evita extensos bosques, praderas y desiertos alejados del desarrollo humano. Se alimenta principalmente de las semillas de granos y malezas, pero es un comedor oportunista y comúnmente come insectos y muchos otros alimentos. Sus depredadores incluyen gatos domésticos, halcones, búhos y muchas otras aves y mamíferos depredadores. Debido a su número, ubicuidad y asociación con los asentamientos humanos, el gorrión común es culturalmente prominente. Es perseguido extensivamente, y usualmente sin éxito, como una plaga agrícola. También se ha mantenido a menudo como mascota, además de ser un alimento y un símbolo de la lujuria, la potencia sexual, el sentido común y la vulgaridad. Aunque está muy extendida y es abundante, su número ha disminuido en algunas zonas. El gorrión común (Passer domesticus) también denominado pardal es un tipo de ave de la familia de los gorriones (Passeridae) y una de las más conocidas y difundidas de los pájaros cantores. El gorrión se unió a la raza humana hace más de 10.000 años como seguidor cultural. Después de numerosas naturalizaciones (fue introducida) intencionales o accidentales, se puede encontrar en casi todas partes; con la excepción de los trópicos, donde pasa todo el año. La población mundial se estima en unos 500 millones de individuos. Después de una disminución significativa de la población en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Europa Central Occidental, la especie fue incluida en la lista de alerta temprana de especies amenazadas. Los machos y las hembras difieren claramente en su coloración: los machos son marcadamente más ricos en contraste que las hembras, tienen una garganta negra o gris oscura y un babero negro, que puede ser cubierto sin embargo por bordes de plumas más claros en el otoño después de la muda. La ingesta de alimentos de estas aves casi siempre tiene lugar de forma sociable, también durante el la temporada de apareamiento y de cría de los polluelos. Los gorriones comunes también se bañan todo el año y la luz del sol es un fuerte estimulante para ellos. Gorrión Común entre las ramas Reino: Animalia Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Clase: Aves Orden: Passeriformes Familia: Passeridae Género: Passer Especie: Passer domesticus Hábitat y distribución El gorrión común se originó en el Medio Oriente y se extendió, junto con la agricultura, a la mayor parte de Eurasia y partes del norte de África. Desde mediados del siglo XIX, ha llegado a la mayor parte del mundo, principalmente debido a introducciones deliberadas, pero también a través de la dispersión natural y marítima. Su área de distribución introducida abarca la mayor parte de América del Norte, América Central, América del Sur, Sudamérica, África del Sur, África Occidental, Australia, Nueva Zelanda e islas de todo el mundo. Ha ampliado considerablemente su área de distribución en el norte de Eurasia desde la década de 1850, y continúa haciéndolo, como lo demuestran las colonizaciones alrededor de 1990 en Islandia y la isla de Rishiri, Japón. La extensión de su área de distribución la convierte en el ave silvestre más ampliamente distribuida en el planeta. Distribución del Gorrión Común (Passer domesticus) Rango de Introducción El gorrión común ha tenido mucho éxito en la mayor parte del mundo, donde ha sido introducido. Esto se debe principalmente a su adaptación temprana a la convivencia con los seres humanos y a su adaptabilidad a una amplia gama de condiciones. Otros factores pueden incluir su robusta respuesta inmunológica, en comparación con el gorrión euroasiático. En los casos en que se introduce, puede extender su área de distribución rápidamente, a veces a una velocidad superior a 230 km (140 millas) por año. En muchas partes del mundo, se ha caracterizado como una plaga y constituye una amenaza para las aves nativas. Algunas introducciones han desaparecido o han tenido un éxito limitado, como las de Groenlandia y Cabo Verde. La primera de muchas introducciones exitosas a Norteamérica ocurrió cuando se liberaron aves de Inglaterra en la ciudad de Nueva York, en 1852 para controlar los estragos de la palomilla tilo. En América, el gorrión común ahora se encuentra desde los Territorios del Noroeste de Canadá hasta el sur de Panamá, y es una de las aves más abundantes del continente. El gorrión común fue introducido por primera vez en Australia en 1863 en Melbourne y es común en toda la parte oriental del continente hasta el Cabo York, pero se le ha impedido establecerse en Australia Occidental, donde se mata a todos los gorriones comunes que se encuentran en el estado. Los gorriones comunes fueron introducidos en Nueva Zelanda en 1859, y desde allí llegaron a muchas de las islas del Pacífico, incluyendo Hawaii. En el sur de África, las aves de la subespecie europea Passer domesticus domesticus y de la subespecie india Passer domesticus indicus se introdujeron alrededor de 1900. Las aves de ascendencia Passer domesticus domesticus están confinadas en unas pocas ciudades, mientras que las aves Passer domesticus indicus se han propagado rápidamente, llegando a Tanzania en la década de 1980. A pesar de esta rápida propagación, también existen parientes nativos como el gorrión del Cabo, que prospera en hábitats urbanos. En Sudamérica, se introdujo por primera vez cerca de Buenos Aires hacia 1870, y rápidamente se hizo común en la mayor parte del sur del continente. En la actualidad se presenta casi continuamente desde Tierra del Fuego hasta los límites de la cuenca del Amazonas, con poblaciones aisladas tan al norte como la costa de Venezuela. ¿Dónde vive el gorrión común? El gorrión común está estrechamente relacionado con la habitación y el cultivo de los humanos. No es una obligación comensal de los humanos, como algunos han sugerido: las aves de la subespecie migratoria de Asia Central suelen reproducirse lejos de los humanos en campo abierto, y las aves de otros lugares se encuentran ocasionalmente lejos de los humanos. Los únicos hábitats terrestres en los que el gorrión común no habita son la tundra y los bosques densos. Bien adaptada a la vida humana, con frecuencia vive e incluso se reproduce en interiores, especialmente en fábricas, almacenes y zoológicos. Se ha registrado su reproducción en una mina de carbón inglesa a 640 m (2.100 pies) bajo tierra, y se alimenta de la plataforma de observación del Empire State Building por la noche. Alcanza su mayor densidad en los centros urbanos, pero su éxito reproductivo es mayor en los suburbios, donde los insectos son más abundantes. En mayor escala, es más abundante en las zonas de cultivo de trigo como el medio oeste de los Estados Unidos. Tolera una variedad de climas, pero prefiere condiciones más secas, especialmente en climas tropicales húmedos. Tiene varias adaptaciones a áreas secas, incluyendo una alta tolerancia a la sal y la capacidad de sobrevivir sin agua mediante la ingestión de bayas. En la mayor parte del este de Asia, el gorrión común está totalmente ausente, reemplazado por el gorrión de Eurasia. Cuando estas dos especies se superponen, el gorrión común es generalmente más común que el gorrión de Eurasia, pero una especie puede reemplazar a la otra de una manera que la ornitóloga Maud Doria Haviland describió como «aleatoria, o incluso caprichosa». En la mayor parte de su área de distribución, el gorrión común es extremadamente común, a pesar de algunas disminuciones, pero en hábitats marginales como la selva tropical o las cordilleras montañosas, su distribución puede ser irregular. Dispersión y migración La mayoría de los gorriones comunes no se mueven más que unos pocos kilómetros durante su vida. Sin embargo, la migración es limitada en todas las regiones. Algunas aves jóvenes se dispersan a grandes distancias, especialmente en las costas, y las aves de montaña se desplazan a elevaciones más bajas en invierno. Dos subespecies, Passer domesticus bactrianus y Passer domesticus parkini, son predominantemente migratorias. A diferencia de las aves en poblaciones sedentarias que migran, las aves de subespecies migratorias se preparan para la migración aumentando de peso. Características Es un ave compacta con el pecho lleno y la cabeza grande y redondeada. Gorrión Común (Passer domesticus) El gran Gorrión Común (Passer domesticus) Dos Gorriones Comunes (Passer domesticus) en un árbol Gorrión Común (Passer domesticus) posando en una rama Gorriones Comunes (Passer domesticus) copulando Gorrión Común en la mano de una persona Gorrión Común (Passer domesticus) volando Una Pareja de Gorrión Común (Passer domesticus) Gorrión Común (Passer domesticus) emitiendo sonidos Gorrión Común entre las ramas Apareamiento del Gorrión Común (Passer domesticus) El gorrión común mide aproximadamente 16 cm (6,3 pulgadas) de largo y mide entre 14 y 18 cm (5,5 y 7,1 pulgadas). Su pico es robusto y cónico con una longitud de culmen de 1.1 a 1.5 cm (0.43 a 0.59 in), fuertemente construido como una adaptación para comer semillas. Su cola es corta, de 5,2 a 6,5 cm (2,0 a 2,6 pulgadas) de largo. La cuerda alar es de 6,7 a 8,9 cm (2,6 a 3,5 pulgadas), y el tarso es de 1,6 a 2,5 cm (0,63 a 0,98 pulgadas). En masa, el gorrión común varía de 24 a 39,5 g (0,85 a 1,39 onzas). Las ejemplares hembras de esta especie tienden a ser un poco más pequeñas que los ejemplares machos. La masa media en el continente europeo para ambos sexos es de unos 30 g (1.1 oz), y en las subespecies más australes es de unos 26 g (0.92 oz). Las aves más jóvenes son más pequeñas, los machos son más grandes durante el invierno, y las hembras son más grandes durante la estación de cría. Las aves en latitudes más altas, climas más fríos, y a veces altitudes más elevadas son más grandes (bajo el dominio de Bergmann), tanto entre las subespecies como dentro de ellas. Colores El plumaje del gorrión común es en su mayoría de diferentes tonos de gris y marrón. Los sexos muestran un fuerte dimorfismo: la hembra es en su mayor parte pulida por encima y por debajo, mientras que el macho tiene marcas en la cabeza, un dorso rojizo y partes inferiores grises. El macho tiene una corona gris oscura desde la parte superior de su pico hasta su dorso, y marrón castaño que flanquea su corona a los lados de su cabeza. Tiene negro alrededor de su pico, en su garganta, y en los espacios entre su pico y sus ojos. Tiene una pequeña raya blanca entre las orejas y la corona y pequeñas manchas blancas inmediatamente detrás de los ojos (postoculares), con manchas negras por debajo y por encima de ellos. Las partes inferiores son de color gris pálido o blanco, al igual que las mejillas, las orejeras y las rayas en la base de la cabeza. La parte superior de la espalda y el manto son de color marrón cálido, con amplias vetas negras, mientras que la parte inferior de la espalda, la grupa y la parte superior de la cola son de color marrón grisáceo. El macho es más opaco en su plumaje fresco no reproductor, con puntas blanquecinas en muchas plumas. El uso y el acicalamiento exponen muchas de las marcas marrones y negras brillantes, incluyendo la mayor parte del parche negro en la garganta y el pecho, llamado «babero» o «insignia». La insignia es variable en anchura y tamaño general, y puede indicar estatus social o estado físico. Esta hipótesis ha dado lugar a una «verdadera industria artesanal» de estudios que sólo han demostrado de manera concluyente que las manchas aumentan de tamaño con la edad: el pico del macho es negro en la época de cría y el cuerno (gris oscuro) durante el resto del año. La hembra no tiene manchas negras ni corona gris. Sus partes superiores y la cabeza son de color marrón con vetas más oscuras alrededor del manto y un supercilium pálido distinto. Las zonas menores son de color grisáceo marrón desencajado. El pico de la hembra es de color gris parduzco y se oscurece en el plumaje reproductivo, acercándose al negro del pico del macho. Los ejemplares juveniles son similares a la hembra adulta, pero de color marrón más oscuro en la parte inferior y más pálido en la superior, con supercilios más pálidos y menos definidos. Las aves juveniles tienen bordes de plumas más anchos y tienden a tener un plumaje más suelto y desaliñado, como los adultos en muda. Los machos jóvenes tienden a tener gargantas más oscuras y postoculares blancas como los machos adultos, mientras que las hembras jóvenes tienden a tener gargantas blancas. Sin embargo, las aves jóvenes no pueden ser sexados de manera fiable por el plumaje: algunos machos juveniles carecen de marcas del macho adulto, y algunas hembras juveniles tienen rasgos masculinos. Los picos de las aves jóvenes son de color amarillo claro a paja, más pálidos que el pico de la hembra. Los machos inmaduros tienen versiones más pálidas de las marcas del macho adulto, que pueden ser muy borrosas en el plumaje fresco. En su primera temporada de cría, las aves jóvenes generalmente son indistinguibles de otros adultos, aunque pueden ser más pálidas durante su primer año. Canto La mayoría de las vocalizaciones del gorrión común son variaciones de su canto corto e incesante. Transcrito como chirrup, tschilp, o philip, esta nota es hecha como una llamada de contacto por aves en bandada o en reposo, o por machos para proclamar la propiedad del nido e invitar a la pareja. En la época de cría, el macho hace esta llamada repetidamente, con énfasis y velocidad, pero sin mucho ritmo, formando lo que se describe como un canto o una «llamada extática» similar a un canto. Los pájaros jóvenes también hacen un verdadero canto, especialmente en cautiverio, un gorjeo similar al del verderón europeo. Los machos agresivos dan una versión trémula de su llamada, transcrita como «chur-chur-r-r-it-it-it-it-it-it-it». Esta llamada también es utilizada por las hembras en la época de cría, para establecer el dominio sobre los machos mientras los desplazan para alimentar a las crías o incubar los huevos. Los gorriones comunes dan una llamada de alarma nasal, cuyo sonido básico se transcribe como quer, y una llamada de chillido estridente en gran angustia. Otra vocalización es la «llamada al apaciguamiento», un suave “quee” que se da para inhibir la agresión, generalmente entre las aves de una pareja apareada. Estas vocalizaciones no son exclusivas del gorrión común, sino que son compartidas, con pequeñas variaciones, por todos los gorriones. Los gorriones comunes también pueden copiar las llamadas de alarma de estorninos y mirlos. Además, investigaciones recientes muestran que las alarmas de otras especies de aves son bien conocidas. Hoy en día es relativamente desconocido que los gorriones comunes son también «estudiantes de canto» muy adaptables. En el siglo XVIII era un juego popular para enseñar el canto de los pájaros. Existe un número considerable de informes y evidencias de que los gorriones comunes criados en compañía de canarios, por ejemplo, aprenden perfectamente su arrullo rodante, incluso si lo imitan con sus voces duras y fuertes. Sonido del Gorrión Común ♀n-Común.ogg ¿Cómo Identificar al Gorrión Común? El gorrión común puede confundirse con otras aves que comen semillas, especialmente con sus parientes del género Passer, por eso saber cómo es el gorrión común suele ser difícil. Muchos de estos parientes son más pequeños, de aspecto más limpio o más «único», como el gorrión del Mar Muerto. La hembra de color apagado a menudo no se distingue de otras hembras y es casi idéntica a la de los gorriones españoles e italianos. El gorrión arbóreo euroasiático es más pequeño y es más esbelto, con una corona de castaño y una mancha negra en cada mejilla. El gorrión macho español y el gorrión italiano se distinguen por sus coronas de castaño. El gorrión diadema es muy similar pero más pequeño, con menos negro en la garganta del macho y un supercilium pálido distinto en la hembra. Alimentación Como adulto, el gorrión común se alimenta principalmente de las semillas de los granos y las malas hierbas, pero es oportunista y adaptable, y come cualquier alimento disponible. En los pueblos y ciudades, a menudo busca comida en los contenedores de basura y se congrega al aire libre de los restaurantes y otros establecimientos de comidas para alimentarse de los restos de comida y las migajas. Puede realizar tareas complejas para obtener alimentos, como abrir puertas automáticas para entrar a los supermercados, aferrarse a las paredes de los hoteles para observar a los vacacionistas en sus balcones, y robar néctar a las flores kowhai, Al igual que muchos otros pájaros, el gorrión común requiere de agallas para digerir los elementos más duros de su dieta. El grano puede ser piedra, a menudo granos de mampostería, o la cáscara de huevos o caracoles; se prefieren granos oblongos y ásperos. Varios estudios sobre el gorrión doméstico en las zonas agrícolas templadas han encontrado que la proporción de semillas en su dieta es de aproximadamente el 90%. El gorrión común se alimenta de casi todas las semillas, pero en los lugares donde puede elegir prefiere la avena y el trigo. En las zonas urbanas, el gorrión común se alimenta en gran medida de alimentos proporcionados directa o indirectamente por los seres humanos, como el pan, aunque prefiere las semillas crudas. Otros gorriones también comen algo de materia vegetal además de semillas, incluyendo brotes, bayas y frutos como uvas y cerezas. En áreas templadas, el gorrión común tiene un hábito inusual de arrancar flores, especialmente amarillas, en la primavera. Los animales constituyen otra parte importante de la dieta del gorrión común, principalmente los insectos, de los cuales son especialmente importantes los escarabajos, las orugas, las moscas dípteras y los pulgones. Se comen varios artrópodos no insectos, moluscos y crustáceos, lombrices e incluso vertebrados como lagartijas y ranas. Los gorriones comunes jóvenes se alimentan principalmente de insectos hasta unos 15 días después de la eclosión y también se les dan pequeñas cantidades de semillas, arañas y arena. En la mayoría de los lugares, los saltamontes y grillos son los alimentos más abundantes de los polluelos. Los verdaderos chinches, hormigas, moscas sierra y escarabajos también son importantes, pero los gorriones comunes se aprovechan de cualquier alimento que sea abundante para alimentar a sus crías. Se ha observado que los gorriones comunes roban presas de otras aves, incluyendo los petirrojos americanos. Video del Gorrión Común Albino (Passer domesticus) ♀n-Común-Albino-Passer-domesticus.webm Los gorriones comunes pueden reproducirse en su respectiva temporada de reproducción inmediatamente después de su eclosión, y a veces intentan hacerlo. Algunas aves que se reproducen por primera vez en áreas tropicales tienen sólo unos pocos meses de edad y todavía tienen plumaje juvenil. Las aves que se reproducen por primera vez rara vez tienen éxito en la crianza de sus crías, y el éxito reproductivo aumenta con la edad, ya que las aves más viejas se reproducen más temprano en la temporada de reproducción, y crían más jóvenes. A medida que se acerca la temporada de reproducción, las liberaciones de hormonas provocan enormes aumentos en el tamaño de los órganos sexuales y los cambios en la duración del día llevan a los machos a empezar a llamar por los sitios de anidación. El momento del apareamiento y la puesta de huevos varía geográficamente, y entre lugares y años específicos, debido a que se necesita un suministro suficiente de insectos para la formación de huevos y la alimentación de los polluelos. Los machos ocupan los sitios de anidación antes de la temporada de reproducción, llamando con frecuencia a su lado. Los ejemplares machos no apareados comienzan a construir nidos y llaman con especial frecuencia para atraer a las hembras. Cuando una hembra se acerca a un macho durante este período, el macho se muestra moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras se inclina y tiembla las alas, empujando su cabeza, levantando y extendiendo su cola, y mostrando su babero. Los machos pueden tratar de aparearse con las hembras mientras llaman o realizan muestra. En respuesta, una hembra adoptará una postura amenazante y atacará a un macho antes de huir, perseguido por el macho. El macho se exhibe frente a ella, atrayendo a otros machos, que también persiguen y exhiben a la hembra. Otros machos no suelen copular con la hembra. La cópula es iniciada típicamente por la hembra dando una suave llamada de dee-dee-dee-dee al macho. Las aves de una pareja copulan frecuentemente hasta que la hembra pone huevos, y el macho monta a la hembra repetidamente. El gorrión común es monógamo, y típicamente se aparea de por vida. Los pájaros de las parejas suelen realizar cópulas extra-parejas, por lo que alrededor del 15% de los polluelos del gorrión común no están relacionados con la pareja de su madre. Los gorriones comunes machos protegen a sus parejas cuidadosamente para evitar ser cornudos o una infidelidad, y la mayoría de las cópulas extra-parejas tienen lugar fuera de los sitios de nidificación. Muchas aves no encuentran un nido y una pareja, y en su lugar pueden servir como ayudantes alrededor del nido para las parejas apareadas, un papel que aumenta las posibilidades de ser elegidos para reemplazar a una pareja perdida. Las parejas perdidas de ambos sexos pueden ser reemplazadas rápidamente durante la época de cría. La formación de una pareja y el vínculo entre las dos aves está ligado a la retención de un lugar de nidificación, aunque los gorriones comunes pueden reconocerse entre sí lejos del nido. Nidificación Los sitios de anidación son variados, aunque se prefieren las cavidades. Los nidos se construyen con mayor frecuencia en los aleros y otras grietas de las casas. Un gorrión a veces excava sus propios nidos en bancos de arena o ramas podridas, pero con mayor frecuencia utiliza los nidos de otras aves, como los de golondrinas en bancos y acantilados, y los nidos de las viejas cavidades de los árboles. Usualmente usa nidos desiertos, aunque a veces usurpa nidos activos. Los huecos de los árboles son más comúnmente usados en Áamérica que en Europa, poniendo a los gorriones en competencia con los pájaros azules y otros nidos de las cavidades norteamericanas, y por lo tanto contribuyendo a la disminución de sus poblaciones. Especialmente en las zonas más cálidas, el gorrión común puede construir sus nidos al aire libre, en las ramas de los árboles, especialmente los de hoja perenne y los espinos, o en los nidos de grandes pájaros como las cigüeñas o las urracas. En los sitios de nidificación abiertos, el éxito reproductor tiende a ser menor, ya que la reproducción comienza tarde y el nido puede ser fácilmente destruido o dañado por las tormentas. Los sitios de nidificación menos comunes incluyen las luces de las calles y los letreros de neón, favorecidos por su calidez; y los viejos nidos abiertos de otros pájaros cantores, que luego son abovedados. El nido suele ser abovedado, aunque puede carecer de techo en lugares cerrados. Tiene una capa externa de tallos y raíces, una capa intermedia de hierba y hojas muertas, y un revestimiento de plumas, así como de papel y otros materiales blandos. Los nidos suelen tener dimensiones externas de 20 × 30 cm (8 × 12 pulgadas), pero su tamaño varía enormemente. La construcción del nido es iniciada por el macho no apareado mientras se muestra a las hembras. La hembra ayuda a construir, pero es menos activa que el macho. Algunos nidos se construyen durante todo el año, especialmente después de la muda en otoño. En las zonas más frías, los gorriones comunes construyen nidos de dormideros especialmente creados, o se posan en las farolas de las calles, para evitar perder calor durante el invierno. Los gorriones comunes no tienen territorios, pero defienden sus nidos de manera agresiva contra los intrusos del mismo sexo. Los nidos de los gorriones comunes soportan una amplia gama de insectos carroñeros, incluyendo moscas nidificantes como Neottiophilum praestum, Protocalliphora blowflies, y más de 1 400 especies de escarabajos. Huevos y crías Las nidadas suelen estar compuestas por cuatro o cinco huevos, aunque se han registrado números del uno al diez. Por lo general se colocan al menos dos puestas, y hasta siete al año pueden colocarse en los trópicos o cuatro al año en latitudes templadas. Cuando se ponen menos nidadas en un año, especialmente en latitudes más altas, el número de huevos por nidada es mayor. Los gorriones comunes de Asia Central, que migran y sólo tienen una nidada al año, tienen un promedio de 6,5 huevos en una nidada. El tamaño de puesta también se ve afectado por las condiciones ambientales y estacionales, la edad de las hembras y la densidad de reproducción. Algunos parasitismos de cría entre ejemplares de la misma especie suelen aparecer, y los casos de cantidades inusualmente grandes de huevos en un nido pueden ser el resultado de que las hembras pongan huevos en los nidos de sus vecinos. El gorrión común es víctima de parásitos reproductores interespecíficos, pero sólo en raras ocasiones, ya que suele utilizar nidos en agujeros demasiado pequeños para que entren los parásitos y alimenta a sus crías con alimentos inadecuados para ellos. A su vez, el gorrión común ha sido registrado una vez como parásito reproductivo de la golondrina americana de los acantilados. Cría de un Gorrión Común (Passer domesticus) Huevos del Gorrión Común (Passer domesticus) Nido artesanal del Gorrión Común con crías Los huevos del Gorrión Común (Passer domesticus) Nido y crías del Passer domesticus Pequeño polluelo de Gorrión Común Polluelo del Gorrión Común (Passer domesticus) Polluelos del Gorrión Común (Passer domesticus) Nido del Gorrión Común en un árbol Pequeña cría del Gorrión Común Casa nido de un Gorrión Común (Passer domesticus) El gorrión común tiene un área de distribución y una población extremadamente grande, y no está seriamente amenazado por las actividades humanas, por lo que se le considera de menor preocupación, por la conservación en la Lista Roja de la UICN. Sin embargo, las poblaciones han ido disminuyendo en muchas partes del mundo. Estas disminuciones se notaron por primera vez en Norteamérica, donde se atribuyeron inicialmente a la propagación del pinzón común, pero han sido más severas en Europa Occidental. Las disminuciones no han sido universales, ya que no se han reportado disminuciones serias en Europa Oriental, sino que incluso han ocurrido en Australia, donde se introdujo el gorrión común recientemente. En Gran Bretaña, las poblaciones alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 1970, pero desde entonces han disminuido en un 68% en total, y alrededor del 90% en algunas regiones. En Londres, el gorrión común casi desapareció del centro de la ciudad. El número de gorriones comunes en los Países Bajos se ha reducido a la mitad desde la década de 1980, por lo que el gorrión común se considera incluso una especie en peligro de extinción. Esta situación se generalizó después de que un gorrión común hembra, denominada «Dominomus«, fuera asesinada tras derribar fichas de dominó colocadas como parte de un intento de establecer un récord mundial. Estas disminuciones no son inauditas, ya que se produjeron reducciones similares en la población cuando el motor de combustión interna sustituyó a los caballos en la década de 1920 y se perdió una fuente importante de alimento en forma de derrame de granos. Se han propuesto varias causas para la drástica disminución de la población, incluyendo la depredación, en particular por parte de los gavilanes euroasiáticos; radiación electromagnética de los teléfonos móviles; y enfermedades. La escasez de lugares de nidificación causada por cambios en el diseño de los edificios urbanos es probablemente un factor, y las organizaciones de conservación han fomentado el uso de nidos especiales para los gorriones. Una de las causas principales del declive parece ser el suministro insuficiente de alimento para insectos a los gorriones anidadores. La disminución de las poblaciones de insectos se debe al aumento de los monocultivos, el uso intensivo de pesticidas, la sustitución de plantas nativas en las ciudades con plantas introducidas y zonas de estacionamiento, y posiblemente la introducción de gasolina sin plomo, que produce compuestos tóxicos como el nitrito de metilo. La protección de los hábitats de insectos en las granjas y la siembra de plantas nativas en las ciudades benefician al gorrión común, al igual que el establecimiento de espacios verdes urbanos. Para concienciar sobre las amenazas que pesan los gorriones comunes, el Día Mundial del Gorrión se celebra el 20 de marzo en todo el mundo desde 2010. En los últimos años, la población de gorrión común ha disminuido en muchos países asiáticos, y esta disminución es bastante evidente en la India. Para promover la conservación de estas aves, en 2012, el gorrión común fue declarado ave de estado de Delhi. Curiosidades Los gorriones comunes se activan durante el crepúsculo de la clase media. En promedio, el canto comienza unos 18 minutos antes del amanecer, y las diferencias de brillo causadas por las nubes no se ven afectadas en gran medida. El final de la actividad es también en invierno antes de la puesta del sol. En las latitudes medias se observan ocasionalmente actividades nocturnas, por ejemplo, la captura

arbustos. 2. Atracción sexual: El color del plumaje del gorrión también es importante en la atracción sexual y la selección de pareja. Los machos tienen un plumaje más brillante y colorido para atraer a las hembras. Las hembras a menudo seleccionan a los machos con el plumaje más brillante y saludable como pareja. 3. Comunicación: El color del plumaje también puede ser utilizado para la comunicación entre los gorriones. Algunas especies de gorriones tienen un plumaje que cambia de color para indicar su estado de ánimo o para comunicar información como el territorio y la ubicación de los alimentos. 4. Protección contra los rayos UV: El plumaje del gorrión también actúa como protección contra los rayos UV del sol. Los gorriones con plumaje más oscuro tienen más melanina en su piel, lo que los hace menos propensos a sufrir quemaduras solares. En conclusión, el plumaje del gorrión es mucho más importante de lo que parece a simple vista. Desde el camuflaje hasta la atracción sexual y la comunicación, el color del plumaje juega un papel crucial en la supervivencia de la especie. Por lo tanto, la próxima vez que veas un gorrión, presta atención a su plumaje y aprecia su belleza y funcionalidad. En conclusión, los gorriones son aves fascinantes que, aunque parezcan simples y comunes, tienen una gran diversidad de colores y características que los hacen únicos. Ahora que sabes todo lo que necesitas saber sobre su color, podrás identificarlos y apreciarlos aún más en tu entorno. Además, es importante recordar la importancia de cuidar y proteger a estas aves para que puedan seguir siendo parte de nuestro ecosistema. ¡No olvides seguir explorando y descubriendo la belleza de la naturaleza que nos rodea! ¡Gracias por leer y espero que hayas aprendido algo nuevo!